

令和 6 年度学校保健統計調査結果（山形県）について

学校保健統計調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的として、文部科学省が昭和 23 年度から毎年実施している国の基幹統計調査です。

本日、文部科学省より令和 6 年度の確定値が公表されますので、山形県分の調査結果について、お知らせします。

1 調査概要

- (1) 調査対象： 県内の国立、公立、私立の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校の満 5 歳から 17 歳までの幼児、児童及び生徒の一部。
[抽出率] 発育状態：全幼児、児童及び生徒の 12.6% (12,742 人)
健康状態：全幼児、児童及び生徒の 50.4% (50,970 人)
- (2) 調査事項：学校保健安全法により実施される健康診断の結果に基づき、児童等の発育状態（身長、体重）及び健康状態（疾病・異常の有無）を調査。
- (3) 調査時期：令和 6 年 4 月 1 日から令和 6 年 6 月 30 日の間に実施。

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2～5 年度の健康診断の実施時期が 4 月～翌年 3 月の 1 年間であったため、学校保健統計調査結果の公表は翌年度となっていた。

令和 6 年度から健康診断の実施時期が 4～6 月の通常時期に戻ったため、学校保健統計調査結果は令和 6 年度中の公表となった。

2 調査結果（発育状態）の概要

(1) 身長（平均値）

全国と比べて、男子、女子とも全年齢で上回っている。

<全国順位の3位以内の区分>

[男子]	5 歳	111.2 cm	全国 3 位	(全国 : 110.6cm)
	9 歳	134.9 cm	全国 3 位	(全国 : 134.0cm)
	15 歳	169.5 cm	全国 2 位	(全国 : 168.6cm)
[女子]	9 歳	135.5 cm	全国 1 位	(全国 : 134.1cm)
	12 歳	153.0 cm	全国 3 位	(全国 : 152.3cm)
	17 歳	158.7 cm	全国 1 位	(全国 : 158.0cm)

(2) 体重（平均値）

全国と比べて、男子、女子とも全年齢で上回っている。

<全国順位の3位以内の区分>

[男子]	8 歳	28.6 kg	全国 3 位	(全国 : 27.6kg)
	9 歳	32.6 kg	全国 3 位	(全国 : 31.2kg)
[女子]	11 歳	41.3 kg	全国 3 位	(全国 : 40.1kg)
	16 歳	53.6 kg	全国 1 位	(全国 : 52.0kg)
	17 歳	54.1 kg	全国 1 位	(全国 : 52.5kg)

(3) 肥満傾向児の出現率

全国と比べて、男子は全年齢で、女子は 15 歳を除き、各年齢で上回っている。

<全国順位の3位以内の区分>

[男子]	7 歳	11.41%	全国 1 位	(全国 : 6.52%)
	12 歳	16.68%	全国 2 位	(全国 : 12.68%)
[女子]	10 歳	13.24%	全国 3 位	(全国 : 9.10%)
	16 歳	11.92%	全国 1 位	(全国 : 6.77%)

(4) 痩身傾向児の出現率

全国と比べて、男子は 2 割以上の年齢区分で、女子は 5 割以上の年齢区分で上回っている。

<全国順位の3位以内の区分>

[女子]	8 歳	2.31%	全国 1 位	(全国 : 1.30%)
	9 歳	3.25%	全国 3 位	(全国 : 2.33%)

3 調査結果（健康状態）の概要

(1) 裸眼視力 1.0 未満の者の割合

小学校及び中学校は過去最も高い割合（※）となっている。

全国と比べて、中学校及び高等学校で上回っていて、幼稚園及び小学校で下回っている。

幼稚園	13.2%	(全国: 26.5%)
小学校	35.3%	(全国: 36.8%)
中学校	65.8%	(全国: 60.6%)
高等学校	71.9%	(全国: 71.1%)

(2) 鼻・副鼻腔疾患の者の割合

小学校は過去最も高い割合（※）となっている。

全国と比べて、高等学校だけが下回っていて、その他の学校は上回っている。

幼稚園	3.6%	(全国: 2.7%)
小学校	18.0%	(全国: 12.1%)
中学校	13.1%	(全国: 10.6%)
高等学校	5.6%	(全国: 7.9%)

(3) むし歯（う歯）の者の割合

全ての学校種別において過去最も低い割合（※）となっている。

全国と比べて、小学校だけが上回っていて、その他の学校は下回っている。

幼稚園	18.4%	(全国: 20.7%)
小学校	34.8%	(全国: 32.9%)
中学校	21.9%	(全国: 26.5%)
高等学校	31.3%	(全国: 34.7%)

(4) ぜん息の者の割合

全国と比べて、小学校及び高等学校で上回っていて、幼稚園及び中学校で下回っている。

幼稚園	1.0%	(全国: 1.2%)
小学校	3.6%	(全国: 2.9%)
中学校	1.3%	(全国: 1.9%)
高等学校	1.7%	(全国: 1.4%)

(※) 令和元年度までと令和6年度の割合の比較

令和2～5年度は健康診断の実施時期が1年間であったため、比較対象から除いている。

以 上