

家畜衛生だより

最上家畜保健衛生所
最上地域家畜畜産物衛生指導協会
令和7年1月20日発行


高病原性鳥インフルエンザ 今シーズン 32～39 例目が発生！

千葉県及び愛知県の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の疑似患畜が確認されました。概要は以下のとおりです。

今シーズン事例数	発生日	発生場所	殺処分羽数（家さんの種類）
国内発生32例目	R7.1.18	千葉県旭市	約48.0万羽（採卵鶏）
国内発生33例目	R7.1.19	愛知県半田市	約12.7万羽（採卵鶏）
国内発生34例目	R7.1.19	愛知県半田市	約20.6万羽（採卵鶏）
国内発生35例目	R7.1.19	愛知県常滑市	約5.9万羽（採卵鶏）
国内発生36例目	R7.1.19	愛知県阿久比町	約25.1万羽（うずら）
国内発生37例目	R7.1.19	千葉県銚子市	約28.0万羽（採卵鶏）
国内発生38例目	R7.1.19	千葉県銚子市	約36.0万羽（採卵鶏）
国内発生39例目	R7.1.19	千葉県旭市	約1.7万羽（採卵鶏）
39例目関連2農場		千葉県旭市	約13.9万羽（採卵鶏）

全国の発生状況（R7.1.19時点）

発生都道府県	発生事例数	殺処分羽数
1道13県	39事例	約693万羽



衛生管理・防疫対策を徹底しましょう

- ☐ 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等
- ☐ 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
- ☐ 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等
- ☐ 家きん舎に立ち入る者の手指消毒等
- ☐ 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
- ☐ 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕
- ☐ ねずみ及び害虫の駆除

飼養鶏に異常を認めた場合は、直ちに家畜保健衛生所にご連絡ください

★ 同じ家きん舎で1日の死亡率が過去21日間の平均死亡率の2倍以上になった場合

★ 沈うつ、肉冠・肉垂等のチアノーゼ、5羽以上がまとまって死亡している、又はうずくまっている場合

最上家畜保健衛生所
（休日・夜間も対応）

電話：0233-29-1357