

家畜衛生だより

最上家畜保健衛生所
最上地域家畜畜産物衛生指導協会
令和7年1月31日発行


高病原性鳥インフルエンザ 今シーズン44～50例目が発生！

千葉県及び愛知県の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の疑似患畜が確認されました。概要は以下のとおりです。

今シーズン事例数	発生日	発生場所	殺処分羽数（家さんの種類）
国内発生44例目	R7.1.28	千葉県旭市	約8.0万羽（肉用鶏）
国内発生45例目	R7.1.28	千葉県銚子市	約24.0万羽（採卵鶏）
国内発生46例目	R7.1.28	千葉県匝瑳市	約22.0万羽（採卵鶏）
国内発生47例目	R7.1.29	千葉県旭市	約3.6万羽（採卵鶏）
国内発生48例目	R7.1.31	愛知県半田市	約42.5万羽（採卵鶏）
国内発生49例目	R7.1.31	千葉県旭市	約7.7万羽（肉用鶏）
国内発生50例目	R7.1.31	千葉県匝瑳市	約8.1万羽（採卵鶏）

全国の発生状況（R7.1.31時点）

発生都道府県 発生事例数 殺処分羽数
1道13県 50事例 約927万羽



衛生管理・防疫対策を徹底しましょう

- ☐ 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等
- ☐ 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
- ☐ 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等
- ☐ 家きん舎に立ち入る者の手指消毒等
- ☐ 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
- ☐ 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕
- ☐ ねずみ及び害虫の駆除

ウイルス侵入防止のため、農場に立ち入るすべての者（従業員、事業者等）に対し、飼養衛生管理遵守を徹底させましょう！！

早期通報の遅れが、地域のまん延リスクを高めます。異状の早期発見、

早期通報を徹底しましょう

飼養鳥の異状を発見した場合は、直ちに家畜保健衛生所まで通報を！！

★ 同じ家きん舎で1日の死亡率が過去21日間の平均死亡率の2倍以上になった場合

★ 沈うつ、肉冠・肉垂等のチアノーゼ、5羽以上がまとまって死亡している、又はうずくまっている場合

最上家畜保健衛生所
（休日・夜間も対応）

電話：0233-29-1357