

家畜衛生だより

最上家畜保健衛生所
最上地域家畜畜産物衛生指導協会
令和7年3月発行

タイラン水溶散（アメリカ腐蛆病^{ふそ}予防薬） の使用方法一部変更のお知らせ

○アメリカ腐蛆病^{ふそ}予防薬の「タイラン水溶散」について、使用方法が一部変更されました（タイラン水溶散の使用にあたっての留意事項 農林水産省 令和7年2月20日改訂）。

1. 代用花粉に添加して投与できるようになります。
2. 従来の投与方法（粉糖投与）では捨て蜜と休薬期間の設定が不要になります。

○アメリカ腐蛆病^{ふそ}（法定伝染病）とは

ミツバチの若齢幼虫が感染し、幼虫やサナギの時期に死亡します。有蓋巣房の中で死骸が粘稠性のある腐蛆^{ふそ}となるのが特徴です。働き蜂を介して群全体に広がります。

原因菌が芽胞を形成するため清浄化が困難で、予防と早期の発見が大切です。



粘性のある腐蛆
（米国農務省）

詳しくは裏面をご確認の上、適正に使用してください。

最上家畜保健衛生所 電話：0233-29-1357
（休日・夜間も対応）

裏面へ続く



養蜂農家の皆様へ

タイラン水溶散が使いやすくなります



- ・ 代用花粉に混ぜて投与(代用花粉投与)できるようになります。
- ・ 従来の投与方法(粉糖に混ぜて振りかける投与方法;粉糖投与)では捨て蜜と休業期間の設定が不要になります。

投与方法は2とおりです

New!

代用花粉投与

タイラン水溶散200mgを代用花粉250gに混ぜて巣箱に設置
※成虫の数に関わらない

投与期間

各回
投与期間後
巣箱の
代用花粉
を除去

1週間

1週間

1週間



粉糖投与

成虫1万匹あたりタイラン水溶散50mgを粉砂糖5gに混ぜて巣箱の上から散布
※成虫の数で調整が必要

投与期間

1週間

1週間

1週間



投与期間後
巣箱に
残った粉糖
を除去

※投与期間終了後に設置

継箱※

継箱※

育児箱

捨て蜜生産期間
(5kg)

出荷用はちみつの
生産期間

出荷用はちみつ
生産には使用しない

・捨て蜜不要
・休業期間なし

出荷用はちみつの
生産期間

注意点

・これまでどおり、投与期間中に貯まった蜜は出荷できません。

正しく使って残留事故を防ぎましょう!