

## 高温対策



いちずに、かじつ。  
150th  
YAMAGATA FRUITS

いいもの成らせるさくらんぼ便り

【緊急特別号】高温対策を徹底し一粒でも多く消費地に届けよう！

# 高温が来る前に、 「すぐりもぎ」を徹底する！

- ◆「6月16日(月)からは、気温が30℃を超える日が続く予報」であり、高温障害果の発生が懸念されます！
- ◆「すぐりもぎ」と「高温対策(灌水、散水、遮光)」を徹底し、ロスを減らして、一粒でも多く消費地に届けよう！

■山形県の天気予報(6月13日5時 山形地方気象台発表)

| 日付              | 今日<br>13日(金) | 明日<br>14日(土) | 明後日<br>15日(日) | 16日(月)        | 17日(火)        | 18日(水)        | 19日(木)        |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 山形県             | 晴<br>        | 曇後一時雨<br>    | 曇時々雨<br>      | 曇一時雨<br>      | 曇<br>         | 曇<br>         | 曇時々晴<br>      |
| 降水確率(%)         | -/0/0/0      | 0/10/40/70   | 70            | 60            | 40            | 40            | 30            |
| 信頼度             | -            | -            | A             | B             | B             | B             | A             |
| 山形<br>気温<br>(℃) | 最高           | 28           | 25<br>(23~30) | 31<br>(28~33) | 33<br>(31~37) | 34<br>(30~36) | 33<br>(29~37) |
|                 | 最低           | -            | 19<br>(17~20) | 20<br>(19~22) | 22<br>(20~24) | 21<br>(18~23) | 21<br>(18~23) |

## 1 すぐりもぎの徹底

- 高温障害が出やすい樹・部位を優先的に収穫
  - ・樹勢が弱い樹
  - ・樹上部や南面、西面など日当たりの良い部位
- 「やまがた紅王」「紅秀峰」は、過着色(黒くツヤがない)になる前に収穫



■「佐藤錦」の高温障害果



■「やまがた紅王」の過着色果

## 2 高温対策の徹底

- 取り組みやすい高温対策から実施する(詳細は[高温対策マニュアル](#)参照)



【対策1】日中の灌水・散水の実施 &lt;裂果がみられる園では実施しない&gt;

- ・地表面が湿る程度に灌水(1~2t程度/10a)
- ・果実が軽く濡れる程度に樹上散水(30~60分間隔で5分間程度)

【対策2】反射シートの撤去

- ・シルバーマルチは高温になりやすいため、今すぐ撤去

【対策3】遮光資材の展張、遮光剤の散布

- ・遮光率40~50%程度の寒冷紗を展張(反射シートの樹上部への設置も可)
- ・雨よけビニルの外側へ遮光剤を散布



◆体が第一！農作業安全、熱中症対策に留意し、作業を進めましょう！